AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-4-761.3135

Rappelens quinne antervention ne serais

d'au moins i charangon par pied, en Royeme,

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE -

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X. SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55 Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS 50 F.

ABONNEMENT ANNUEL

Sous Régisseur de recettes et d'avances AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN Nº 56 - AVRIL 1976

-=-=-=-=-=-=-=-=-

indications de notre avis ne 55 demeurent valables, gauf log nabanda adaga att too do to do asb eparoto setula sel our VIGNE pour lessiver la protection (26 à 36 m m).

EXCORIOSE

La reprise de végétation est générale. Les vignes les plus précoces sont au stade D (sortie des feuilles). Dans les parcelles atteintes (symptômes visibles sur sarments), c'est le moment d'intervenir.

sondage, à l'intérieur de la parcelle, mévriait un seuil disafestation

pour assurer une bonne protection à l'égard des contaminations, deux traitements sont nécessaires, pour couvrir les jeunes feuilles qui se développent :

- 1) au stade C D (environ 50 % des bourgeons au stade "sortie des feuilles") :
 - 2) au stade D E (premiere feuille étalée).

Les produits conseillés sont aussi efficaces contre le black rot :

- dichlofluanide à 200 g/hl (Euparene : 400 g/hl)
- folpel à 150 g/hl (Nombreuses spécialités)
- manebe, mancozebe ou propinebe à 280 g/hl (Nombreuses spécialités)
- folpel + captafol à(160 + 40)g/hl, (Mycodifol F : 250 g/hl) mancozebe + folpel à (135 + 90) g/hl, (Mancofol : 300 g/hl).

BLACK - ROT (Haut Poitou)

Etant donné le temps particulierement sec que nous avons connu jusqu'ici, et le tres faible inoculum présent dans les vignes, toute protection précoce est absolument superflue. Attendre de prochaines indications.

P.12.30

Imprimerie de la Station Poitou-Chare

ZTMIMIZZITMIVA LOV-4-02910 ZIJ/COLZA / A J A

CHARANCON des SILIQUES

Le vol demeure faible et, bien que les colzas soient encore au stade sensible, les risques sont réduits. Il est probable qu'il n'y aura plus à intervenir désormais. La surveillance doit cependant être maintenue quelque temps encore.

Rappelons qu'une intervention ne serait envisageable que si un sondage, à l'intérieur de la parcelle, révelait un seuil d'infestation d'au moins 1 charançon par pied, en moyenne.

Quoiqu'il en soit, respecter la législation concernant les abeilles.

POMMIERS - POIRIERS

developpent:

TAVELURES

Les indications de notre avis n° 55 demeurent valables, sauf localement lorsque les pluies d'orage des 25 et 26 ont été assez abondantes pour lessiver la protection (20 à 30 m m).

Le Chef de la Circonscription Les Ingénieurs chargés des Phytosanitaire "POITOU-CHARENTES" AVERTISSEMENTS AGRICOLES

La reprise de végétation est générale. Les vignes les plus précèces

1) - au stade C - D (environ 50 % des bourgeons/ITOS/ASE. Fortie des

etalée).

(premiere feuille étalée).

(premiere feuille étalée).

Imprimé à la Station le 22 avril 1976 - Préc. Note: Bulletin nº 55 -

- folpel + captafol à (160 + 40)g/hl, (Mycodifol F : 250 g/hl) - mancozebe + folpel à (135 + 90) g/hl, (Mancofol : 300 g/hl).

- mantbe, mancozebe ou propinabe à 280 g/hl (Nombreuses spécialités)

AVRIL 1976 - N° du papier de presse 535 AD 000 4 abinaria la lichtel à 150 0/hl (Nombreuses spécialités)

BLACK - ROT (Haut Poitou)

Etant donné le temps particulièrement sec que nous avons commu jusqu'ici, et le tres faible inoculum présent dans les vignes, toute protection précoce est absolument superflue. Attendre de prochaines indications.

SAT